

AGROQUÍMICOS

HERBICIDAS



H•ATRAZINA 50

Herbicida selectivo que controla principalmente malezas de hoja ancha y algunas gramíneas anuales e impide su crecimiento durante varios meses, en los cultivos de maíz, sorgo granífero y caña de azúcar. Actúa inhibiendo la fotosíntesis de las malezas. Es absorbido a través de las hojas y raíces de las malezas, pudiendo utilizarse en tratamientos de preemergencia y postemergencia.

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL:**
H•ATRAZINA 50
- **CATEGORÍA:**
HERBICIDA SELECTIVO Y SISTÉMICO.
- **SUBCATEGORÍA:**
PRESIEMBRA, PREEMERGENCIA Y POSTEMERGENTE TEMPRANO, PARA MALEZAS DE HOJA ANCHA Y ALGUNAS GRAMÍNEAS ANUALES. ACTÚA COMO UNA HORMONA, DESORGANIZANDO EL CRECIMIENTO DE LA MALEZA.
- **PRESENTACIÓN:**
BIDÓN PLÁSTICO DE 20 LITROS.

FORMULACIÓN

LÍQUIDO FLOABLE
AL 50%.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Por la calidad del formulado, no requiere de una premezcla.
- Es absorbido principalmente por las raíces y también penetra en menor medida a través de las hojas, traslocándose por el interior de las plantas.
- Es selectivo debido a la capacidad por parte de los cultivos en los que se usa de metabolizar este herbicida, transformándolo en compuestos no tóxicos.
- No es volátil, evitándose daños en cultivos susceptibles.

USO

La atrazina es absorbida por raíces y hojas. Para un óptimo desempeño del producto, es necesaria una adecuada preparación de la cama de siembra, aplicando con buena humedad superficial en el suelo. Tener en cuenta que para facilitar la incorporación del herbicida en los primeros centímetros de suelo es necesaria la concurrencia de lluvias posteriores a la aplicación.

Tratamiento de presiembra con incorporación: Una vez preparado el suelo para la siembra, se puede aplicar H•ATRAZINA 50 hasta 10-15 días previo a la siembra, o inmediatamente antes de la misma, incorporándolo a 3-5 cm de profundidad, mediante dos rastras rotativas cruzadas.

Tratamiento de preemergencia: Se debe aplicar H•ATRAZINA 50 inmediatamente después de la siembra del cultivo y antes de la emergencia de las malezas.

Tratamiento de postemergencia temprana: La pulverización con H•ATRAZINA 50 debe efectuarse antes de que las malezas de hoja ancha tengan más de 3-5 hojas y las gramíneas no más de 1-2 hojas.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección personal (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, aguas, y equipos a utilizar.

Consulta técnica
0810-122-YPFD

ypf.com