

## AGROQUÍMICOS

## FUNGICIDAS



## YPF MIXTAR FL

## DESCRIPCIÓN

Es un fungicida compuesto por una mezcla de Triazol + Estrobirulina, esta combinación de principios activos brinda la mejor prevención, curación y erradicación contra el complejo de enfermedades de fin de ciclo, ya que se bloquea la síntesis de ergosterol y el proceso respiratorio de los hongos. Además al poseer dos modos de acción distintos se evita la aparición de cepas resistentes. Amplio espectro de control en soja, maíz y trigo.

## DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**  
YPF MIXTAR FL
- **CATEGORÍA**  
AGROQUÍMICOS
- **SUBCATEGORÍA**  
FUNGICIDAS
- **PRESENTACIÓN**  
CAJA DE 4 BIDONES DE 5 LITROS

## CONCENTRACIÓN

AZOXISTROBINA 250 GRAMOS I.A./LITRO +  
EPOXICONAZOLE 125 GRAMOS I.A./LITRO

## FORMULACIÓN

FORMULADO COMO SOLUCIÓN  
CONCENTRADA (SC).

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Fungicida coformulado compuesto por Azoxistrobina 250 gramos i.a./litro + Epoxiconazole 125 gramos i.a./litro.
- Acción de contacto y sistémica.
- Poderosa mezcla que combina dos principios activos que permiten que las enfermedades no opongan resistencia.
- Efecto preventivo, curativo y erradicante.
- Ideal para el control del complejo de enfermedades de fin de ciclo como también roya asiática de la soja.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Maíz	Roya común del maíz ( <i>Puccinia sorghi</i> ) Tizón del norte ( <i>Cercospora kikuchi</i> )	400 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar a la aparición de las primeras pústulas. En estadios vegetativos del cultivo a partir de V7 a V10 (7 a 10 hojas desplegadas, Ritchie y Hanway, 1982)
Soja	Roya de la soja ( <i>Phakopsora pachyrhizi</i> )	200 - 250 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar al observar los primeros síntomas. De persistir condiciones favorables para la enfermedad y si aparecen nuevas pústulas, aplicar por segunda vez. Dosis mayor en condiciones predisponentes severas.
	Complejo enfermedades de fin de ciclo: Antracnosis Mancha púrpura de la semilla, Tizón de la hoja ( <i>Cercospora kikuchi</i> ) Mancha ojo de rana ( <i>Cercospora sojina</i> ) Mildiu ( <i>Pernospora manshurica</i> ) Alternaria Tizón de la vaina y del tallo Mancha marrón de la soja ( <i>Septoria glycines</i> )	200 - 250 cm <sup>3</sup> /ha	A partir de R3 (comienzo de la fructificación) hasta R6 (máximo tamaño de semilla), cuando se observen los primeros síntomas en la planta.

## AGROQUÍMICOS

## FUNGICIDAS

## YPF MIXTAR

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo	Mancha de la hoja Roya anaranjada ( <i>Puccinia recondita</i> ) Roya amarilla o línea Septoriosis	300 - 400 cm <sup>3</sup> /ha	Aplicar en hoja bandera al aparecer los primeros síntomas.

**MANIPULEO Y ALMACENAJE**

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales.

**PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO**

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

**RECOMENDACIÓN**

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

**PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

**Mayo 2016**

YPF S.A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica  
**0810-222-YPFD**

[ypf.com](http://ypf.com)